



Een gastroscoopie is een onderzoek waarbij met behulp van een flexibele slang het slijmvlies van de slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wordt bekeken. Deze slang heeft aan de tip een lampje met camera en wordt via uw mond in uw maag gebracht. Het onderzoek duurt ongeveer 5-10 minuten.

### Vorbereiding

Voor dit onderzoek moet u nuchter zijn. U mag niets meer eten, drinken of roken vanaf 5 uur voor het onderzoek. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze innemen na afloop van het onderzoek. Wanneer u gewend bent 's ochtends medicatie in te nemen, mag u het inname moment verschuiven tot na het onderzoek. Overleg bij twijfel met uw verwijzend arts.

Als u een gebitsprothese, losse elementen of een mondpiercing draagt, doet u deze vóór het onderzoek uit. Als u een bril heeft, zet deze dan af.

### Het onderzoek

U meldt zich op het afgesproken tijdstip in Kroon Kliniek aan de balie en neemt plaats in de wachtkamer.

- De verpleegkundige zal u ophalen en begeleiden naar de scopie afdeling.
- U wordt verzocht in linker zijligging plaats te nemen op de onderzoeksbank.
- U krijgt een plastic ring tussen uw tanden om de slang te beschermen.
- De flexibele slang wordt voorzien van verdovende gelei en via uw mond geïntroduceerd. De arts/verpleegkundige zal u verzoeken te slikken waarna de slang langzaam naar slokdarm, maag en twaalfvingerige darm wordt opgevoerd.
- In enkele gevallen worden stukjes slijmvlies (biopten) weggenomen voor nader onderzoek. Dit is niet pijnlijk.
- Na afloop van het onderzoek zal de arts de bevindingen met u bespreken en eventueel vervolgafspraken maken.
- Na het onderzoek mag u eten en drinken, tenzij anders vermeld door de uitvoerende arts.

Als u diabetespatiënt bent kan het noodzakelijk zijn om voor het onderzoek de medicatie aan te passen, overleg dit met uw verwijzend arts.

### De nazorg

Indien u een scopie met slaapmedicatie heeft afgesproken, is uw reactievermogen beïnvloed en mag u de rest van de dag niet zelfstandig aan het verkeer deelnemen of belangrijke beslissingen nemen. Het is van belang dat u wordt opgehaald. Houdt u er rekening mee dat u na het onderzoek nog maximaal twee uur op de dagverpleging moet blijven.

### Complicaties

Slechts in zeldzame gevallen treden complicaties op als gevolg van het onderzoek zoals; toenemende buikpijn, koorts of bloedverlies.

### Vragen

Als u nog vragen heeft of problemen ondervindt, kunt u tijdens en buiten kantooruren contact opnemen met Kroon Kliniek, telefoon: 088 – 5380320.